

الملحق 1. تعریفات الحالات والتفشی

الإسهال المائي الحاد

الإسهال المائي الحاد هو مرض يتميز بما يلي:

- يتم تعریف الحاد بأنه يستمر أقل من سبعة أيام
- يتم تعریف البراز المائي بأنه براز سائل غير دموي قد يحتوي على مخاط
- يتم تعریف الإسهال على أنه ظهور ثلاث مرات أو أكثر من البراز الرخو خلال فترة 24 ساعة.

حالة اشتباہ بالکولیرا

في حالة عدم وجود تفتشي محتمل أو مؤكّد للكوليرا

الحالة المشتبه بها للإصابة بالکولیرا هي شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر:

- مع الإسهال المائي الحاد والجفاف الشديد
- أو
- الذي توفي بسبب الإسهال المائي الحاد ولم يعرف أي سبب آخر للوفاة.

في وجود تفتشي محتمل أو مؤكّد للكوليرا

الحالة المشتبه بها للإصابة بالکولیرا هي أي شخص:

- مع الإسهال المائي الحاد؛
- أو
- الذين ماتوا بسبب الإسهال المائي الحاد.

حالة مؤكّدة من الكوليرا

تعتبر حالة الكوليريا المؤكّدة هي أي شخص مصاب بضمة الكوليريا O1 أو O139، كما تم تأكيد ذلك من خلال الثقافة (بما في ذلك التراص المصلي) أو تفاعل البوليميراز المتسلسل.

- ويجب أيضًا إثبات أن سلالة البكتيريا سامة (بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل) إذا لم يكن هناك تفتشي مؤكّد للكوليرا في وحدات المراقبة الأخرى، ولم يكن هناك ارتباط وباقي ثابت بحالة كوليريا مؤكّدة
- أو مصدر تعرض في بلد آخر.

وفاة بسبب الكوليريا المجتمعية

- وفاة حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بالکولیرا، دون وجود سبب آخر معروف للوفاة، والتي تحدث قبل الوصول إلى مرافق صحي.

وفاة بسبب الكوليريا في أحد المرافق الصحية

- وفاة حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بالکولیرا، دون وجود سبب آخر معروف للوفاة، والتي تحدث بعد الوصول إلى مرافق صحي.

اشتباه بتفتشي وباء الكوليريا

يتم الكثف عن تفتشي الكوليريا المشتبه به عندما:

- حالتين أو أكثر من حالات الاشتباہ بالإصابة بالکولیرا؛
- أو

حاله واحدة مشتبه بها بالکولیرا مع نتيجة إيجابية لفحص RDT (+RDT) (RDT)

- يتم الإبلاغ عنها في نفس وحدة المراقبة خلال سبعة أيام.

احتمال تفتشي الكوليريا

- يتم الكثف عن تفتشي محتمل للكوليريا عندما يصل عدد حالات الكوليريا المشتبه بها مع نتيجة إيجابية لاختبار التشخيص السريع (RDT+) إلى حد محدد أو يتجاوزه في غضون 14 يوماً، مع الأخذ في الاعتبار عدد الحالات المشتبه بها التي تم اختبارها (انظر الجدول أدناه).

عدد حالات الكوليرا المشتبه بها التي تم اختبارها إيجابية بواسطة اختبار التخسيص السريع

اكتشاف احتمال تفشي وباء الكوليرا

تم فحص 3 إلى 7 حالات مشتبه بها	على الأقل 3 +RDT
تم فحص 8 إلى 10 حالات مشتبه بها	على الأقل 4 +RDT
تم فحص 11 إلى 14 حالة مشتبه بها	على الأقل 5 +RDT
تم فحص 15 إلى 17 حالة مشتبه بها	على الأقل 6 +RDT
تم فحص 18 إلى 21 حالة مشتبه بها	على الأقل 7 +RDT

تأكيد تفشي وباء الكوليرا

- يتم الكشف عن تفشي الكوليرا المؤكّد عندما يكون لدى وحدة المراقبة حالة كوليرا مؤكّدة واحدة على الأقل تم اكتسابها محلياً.

انتقال العدوى في المجتمع

- الانبعاث المجتمعي هو حدوث حالات مؤكّدة من الكوليرا ليست كلها مرتبطة وبانياً.
- ما لم يتم إثبات انتقال العدوى من خلال التحقيق في الحالات، يتم تصنيف تفشي المرض على أنه انتقال مجتمعي بشكل افتراضي.

النقل المجتمع

- انتقال الكوليرا المجتمع هو حدوث حالات مؤكّدة من الكوليرا مرتبطة جميعها وبانياً، استناداً إلى نتائج التحقيقات في الحالات.
- من المرجح أن يحدث انتقال متجمّع في بداية تفشي الكوليرا (أو نحو نهايته) عندما يكون عدد حالات الكوليرا منخفضاً.