

Додаток 1 . Визначення випадку та спалаху

Гостра водяниста діарея (ГВД)

Гостра водяниста діарея - це захворювання, при якому:

- Гострий визначається як такий, що триває менше семи днів
- Водянисті випорожнення визначаються як некров'янисті рідкі випорожнення, які можуть містити слиз
- Діарея визначається як три або більше рідких випорожнень протягом 24 годин.

Підозра на холеру

За відсутності ймовірного або підтвердженого спалаху холери

Підозрюваний у захворюванні на холеру - це людина віком від двох років:

- з гострою водянистою діареєю та тяжким зневодненням або
- які померли від гострої водянистої діареї без інших відомих причин смерті.

За наявності ймовірного або підтвердженого холери

Підозрюваним у захворюванні на холеру є будь-яка людина:

- з гострою водянистою діареєю;
або
- які померли від гострої водянистої діареї.

Підтверджений випадок холери

- Підтверджений випадок холери - це будь-яка особа, інфікована *Vibrio cholerae* O1 або O139, що підтверджено культуральним методом (включаючи сероаглютинацію) або ПЛР.
- Штам бактерій також повинен бути продемонстрований як токсигенний (за допомогою ПЛР), якщо немає підтвердженого спалаху холери в інших об'єктах епідеміологічного нагляду, а також не встановлено епідеміологічного зв'язку з підтвердженим випадком холери або джерелом контакту в іншій країні.

Смертність від холери в громаді

- Смерть підозрюваного або підтвердженого випадку холери, без інших відомих причин смерті, яка настала до прибуття в медичний заклад.

Смерть від холери в медичному закладі

- Смерть підозрюваного або підтвердженого випадку холери, без інших відомих причин смерті, що настала після прибуття до медичного закладу.

Підозра на спалах холери

- Підозра на спалах холери виникає тоді, коли
- Два або більше випадків підозри на холеру;
або
- Один випадок підозри на холеру з позитивним результатом РДТ (РДТ+)
- повідомляється в той самий підрозділ епіднагляду протягом семи днів.

Ймовірний спалах холери

- Ймовірний спалах холери виявляється, коли кількість підозрюваних випадків холери з позитивним результатом швидкого діагностичного тесту (ШДТ+) досягає або перевищує визначений поріг протягом 14 днів, враховуючи при цьому кількість протестованих підозрюваних випадків (див. таблицю нижче).

Кількість випадків підозри на холеру, протестованих	Кількість випадків підозри на холеру, підтверджених за допомогою	Усний
від 3 до 7 підозрілих випадків	Щонайменше 3 RDT +	Ймовірний спалах холери
від 8 до 10 підозрілих випадків	Щонайменше 4 RDT +	
від 11 до 14 підозрілих випадків	Щонайменше 5 RDT +	
від 15 до 17 підозрілих випадків	Щонайменше 6 RDT +	
від 18 до 21 підозрілих випадків	Щонайменше 7 RDT +	

Підтверджено спалах холери

- Підтверджений спалах холери виявляється тоді, коли в епідеміологічному осередку є принаймні один підтверджений випадок холери, набутий на місцевому рівні.

Передача в громаді

- Громадська передача - це виникнення підтверджених випадків холери, які не всі епідеміологічно пов'язані між собою.
- Якщо в результаті розслідування випадку не було продемонстровано кластерної передачі, спалах за замовчуванням класифікується як передача в громаді.

Кластерна передача даних

- передача холери - це поява підтверджених випадків холери, які епідеміологічно пов'язані між собою на основі результатів розслідувань випадків.
- Кластерна передача більш ймовірна на початку (або наприкінці) спалаху холери, коли кількість хворих на холеру невелика.